



Fiche de spécification

Application

Enzymes polyvalentes de clarification et / ou d'extraction et pour usage unique

Caractéristiques

Enzymes polyvalentes de clarification et / ou d'extraction et pour usage œnologique.

Activité déclarée	Polygalacturonase 6700 PGNU / g
Purification CE	KZYMPLUS® Blanc & Rosé FCE est spécifiquement purifiée. Elle ne contient pas d'activité mesurable Cinnamoyl-esterase (CE)
Aspect physique	Granulé
Couleur	Blanc cassé
Odeur	Légère odeur fermentaire
Producteur	Novozymes
Solubilité	Composant actif facilement soluble dans l'eau à toutes concentrations rencontrées lors d'un usage normal. La standardisation des composants peut occasionner de la turbidité en solution

NB : la couleur peut varier d'un batch de production à l'autre. Elle ne reflète en aucun cas une indication de l'activité enzymatique.

La fiche de données sécurité ainsi que le certificat de conformité réglementaire (RCE 606/2009) sont disponibles sur demande auprès de votre Centre Œnologique ou sur www.icv.fr.

Organisme de production (non OGM)

Aspergillus niger et *Aspergillus aculeatus*
Produits par fermentation submergée d'un microorganisme. L'enzyme est séparée et purifiée à partir de la production du microorganisme.

Caractérisation produit (en conformité avec le Codex Œnologique)

Unité pectinase PGNU	6700 / g
Flore totale	< 5.10 ⁴ UFC/ g
Coliformes totaux	< 30 UFC/ g
<i>Escherichia Coli</i>	Absence / 25 g
<i>Salmonella</i>	Absence / 25 g
Métaux lourds	< 30 mg/ kg
Plomb	< 5 mg / kg
Arsenic	< 3 mg / kg
Mercure	< 0.5 mg / kg
Cadmium	< 0.5 mg / kg

Données de composition

Maltodextrine,	CAS n°9050-36-6
Polygalacturonase,	CAS n°9032-75-1
Eau,	CAS n°7732-18-5
Chlorure de potassium (E508)	CAS n°7447-40-7
Citrate de trisodium dihydrate (E331)	CAS n°6132-04-3
Acide citrique (E330),	CAS n°77-92-9

Conditions de stockage

Stocker entre 4°C-25 °C

L'emballage doit être gardé intact, sec et à l'abri de la lumière. Conditionnement en sachet aluminisé avec bouchon refermable de 300 g ou en outre de 20 kg

DDM : Elle est indiquée au dos du sachet ainsi que sur le certificat d'analyse.

Les DDM au conditionnement sont de 4 ans.

La performance du produit sera optimale si les recommandations de stockage et de dosage ainsi que la Date de Durabilité Minimale (DDM) sont respectées

Dosage

Dose recommandée : 3 g / q ou hL.

Début d'efficacité constaté à partir de 1,5 g / q ou hL (sur raisins à pulpe mûre, raisins ou jus à faible niveau de pectines).

Mise en œuvre

- Diluer l'enzyme, avant son utilisation, dans 10 fois son poids d'eau froide.
Utiliser la solution dans la journée.

- Veiller à une bonne répartition de la solution, par exemple en utilisant une pompe doseuse dont la calibration est contrôlée régulièrement,

- Aucun traitement à la bentonite ne doit être réalisé en même temps que l'utilisation d'enzymes,

- Les enzymes fonctionnent à basse température sur la vendange ou des moûts réfrigérés (blancs, rosés et rouges),

- Ne pas utiliser les enzymes sur raisins ou moûts à des températures de plus de 65°C.

N.B.1 : les enzymes apportées sur raisins ont une activité clarifiante significative puisqu'elles sont aussi en contact avec les pectines du moût ou du moût en FA. Il est donc conseillé aux vinificateurs qui font le choix de l'apport sur raisins de réaliser un test pectines avant tout ajout supplémentaire éventuel sur jus ou vin de presse.

N.B.2 : Leur seul usage autorisé en vinification pour les vins biologiques dans l'union européenne est celui de la clarification sur moût ou sur vin.

Diluez les enzymes dans 10 fois leur volume d'eau soit un sachet de 300 g dans 3 L d'eau.

Avec ces proportions une addition de 30 mL / q ou de 300 mL / T de la solution ainsi préparée correspond à un ajout de 3 g / q de **KZYMLUS® BLANC & ROSÉ**.

Une telle préparation se conserve aisément 24 h sans perdre d'efficacité. Veillez à fermer le cubi ou le bac dans lequel est conservée la solution.

Ajoutez la de manière homogène (voir photos ci – contre) aux raisins ou aux jus en vous assurant que la température est bien < 65°C.

Les enzymes sont des protéines et sont donc totalement dénaturées (donc inefficaces) à 70°C. L'homogénéité de l'addition assure une meilleure efficacité. L'apport en post éraflage permet de limiter les pertes.

Sur les débourbages, l'apport sur raisin avant pressurage est le plus efficace.

Pour ceux qui ne pourraient pas le pratiquer (par exemple en bio), apporter la dose d'enzyme nécessaire à la dépectinisation sur jus le plus tôt possible dès la sortie du pressoir.



Bac de solution et crépines de pompage



Pompes doseuses



Système complet d'apport dans les canalisations



Autre option : pompe doseuse et système d'aspersion sur le quai